

Descriptions de quelques Lampyrides [Col.]
nouveaux de ma collection

par ERNEST OLIVIER.

Dodacles interfusus, n. sp. — *Elongatus, flavus; antennis, articulo primo excepto, nigris; capite et palpis nigris, ore flavo; prothoracis marginibus profunde punctatis, disco laevi, angulis obtusis; scutello triangulari; elytris prothorace haud latioribus, attenuatis, punctatis, costatis, in dimidio apicali nigris; tribus ultimis abdominis segmentis supra et infra nigris; tibiis et tarsis nigris, unguiculis flavis.* — Long. : 7 mill.

Cachabé.

La tache apicale noire des élytres, qui occupe environ la moitié de leur longueur, se termine anguleusement et laisse généralement la marge externe étroitement flave. Cette espèce se rapproche de *D. plumosus* Gorb.; elle en diffère nettement par sa taille bien moindre, sa forme plus étroite et la couleur de son abdomen, dont les quatre premiers segments sont flaves.

Dodacles dubitans Ern. Oliv. var. **fuscicollis**, n. var. — Cette variété, chez laquelle le prothorax est entièrement noir, pourrait être confondue avec *D. nigricollis* Gorb.; mais elle est beaucoup moins grande; le prothorax est brillant et son bord antérieur est plus arrondi; il est presque lisse sur son disque, ses marges seules sont rugueusement ponctuées; les élytres plus étroits sont chargés de deux côtes saillantes prolongées sur presque toute leur longueur.

Brésil (Bruch).

Dryptelytra Grandjeani Ern. Oliv. — Chez le type, provenant de Bolivie, la poitrine flave est traversée par une bande médiane, longitudinale, noire; les trois premiers segments de l'abdomen et la moitié des cuisses postérieures sont testacés.

Un exemplaire de Marcapata (Pérou) a la poitrine toute noire; les hanches et le milieu des trois premiers segments du ventre, seulement, sont testacés.

Dans les deux formes, la marge externe des élytres est testacée, mais dans la partie médiane, cette couleur est réduite à un fin liséré.

Hyas externa, n. sp. — *Oblongo-oralis, atra, nitida; prothoracis apice et elytrorum margine externo in dimidia parte basali, late testaceis; antennis compressis, articulis 3-10 serratis, ultimo lanceolato;*

prothorace brevi, transverso, semilunari, antice leviter sinuato, angulis posticis rotundatis, margine erecto, rugose punctato, disco laevi, nitido, scutello conico, nitido, nigro, vix punctato; elytris prothorace latioribus, apicem versus attenuatis, rugosis, obselete costulatis, atris, macula testacea marginali lata ab humeris usque ad dimidium longitudinis prolongata; ultimo ventrali segmento profundo fisso; ♂ ignotus.
Long. : 17 mill. Lat. hum. 9 mill.

Brésil : Misiones (BRUCH).

Oblong ovalaire, d'un noir brillant, sauf le sommet du prothorax testacé ainsi qu'une bande marginale englobant l'épaule où elle occupe à peu près le tiers de la largeur de l'élytre et qui se continue le long de la marge jusqu'à la moitié de sa longueur où elle se termine en s'amincissant en angle aigu.

Chez un exemplaire de la collection GRANDJEAN, la tache marginale des élytres se prolonge en un mince liséré qui atteint presque l'angle apical.

La côte suturale est parfois légèrement testacée sur une longueur plus ou moins grande.

Tenaspis figurata, n. sp. — *Oculis, fuscis; prothorace brevi, transverso, subtriangulari, antice leviter sinuato et profunde biimpresso, punctato, testaceo, macula triangulari nigra basin et apicem attingente, ornato, angulis posticis rotundatis et tenuissime nigro marginatis; scutello nigro; elytris prothorace latioribus, oratis, fuscis, macula oblonga in medio marginali notatis; coxis et ventre piceis, ultimo segmento dilutiore.* — Long. : 10 mill.

Paraguay (BRUCH).

Prothorax testacé avec une tache noire en triangle aigu qui part de la base et atteint le sommet; à la base de cette tache, de chaque côté, naît un sillon qui aboutit près du bord antérieur à une profonde impression; les angles postérieurs sont finement bordés de brun. Les élytres bruns sont ornés au milieu de leur marge externe d'une tache testacée occupant à peu près la moitié de leur largeur; le bord marginal est sur toute sa longueur très finement testacé. Le dernier segment ventral est d'une nuance plus claire que les précédents.

Dilychnia cavicollis, n. sp. — *Elongata, subparallela, fuscis; mandibulis piceis; antennis filiformibus, vix compressis, corporis dimidio longitudine fere aequalibus; prothorace antice attenuato et rotundato, marginibus testaceis, punctatis, latis et valde supra reflexis, disco aurantiaco, fere laevi, sulcato, basi sinuato, unguis acutis et*

*retro productis; scutello triangulari, testaceo; elytris prothorace vir-
latis, elongatis, subparallelis, pubescentibus, tenuiter crebre punc-
tatis, obsolete costulatis, fuscis, macula humerali, sutura tenuiter et
marginè externo in dimidio basi, latius, testaceis; ♂, pectore nigro,
coxis et femorum basi testaceis, ventre nigro, 5^o et 6^o segmentis eburneis,
ultimo testaceo, brevi, in medio postico aculeato: pygidio trilobato:
♀, major, pectore testaceo, coxis et femorum majore parte testaceis:
ventre nigro, 5^o et 6^o segmentis macula semilunari eburnea, ultimo
lato, trapeziforme, postice breviter inciso. — Long. : ♂ 13 mill.; ♀
17 mill.*

Brésil : prov. Goyas.

Bien caractérisé par sa forme étroite, allongée, les marges du prothorax larges, fortement redressées, et la coloration des élytres : ceux-ci sont noirs avec les parties suivantes testacées : un point sur le calus huméral, une très fine bordure suturale et une marginale large, plus développée dans le milieu de l'élytre. Chez l'unique individu mâle que j'ai vu, ces bordures ne se rejoignent pas et le sommet de l'angle apical reste entièrement noir.

Diaphanes Splichali, n. sp. — *Elongatus: antennis prothorace brevioribus, piceis; prothorace pallide testaceo, elongato, antice rotundato, crebre et profunde punctato, disco laevi, duabus magnis plagis diaphanis anticis fere conjunctis, angulis posticis obtusis: scutello angusto, triangulari, testaceo; elytris prothorace latioribus, elongatis, subparallelis, rugosis, costulatis, griseis, testaceo tenue limbatis: subtis testaceus, quatuor primis ventris segmentis postice fusco marginatis, tribus ultimis cereis, ultimo recte truncato: pygidio trisinuato; tibiis et tarsis obscuris. — Long. : 14 mill.*

Thibet S.-O. : Poo.

Cette espèce m'a été communiquée par M. SPLICHAL à qui je me fais un plaisir de la dédier en le remerciant de l'amabilité avec laquelle il a bien voulu m'en abandonner un exemplaire.

Diaphanes Splichali est voisin de *D. marginellus* Hope, du Népal; mais ce dernier a le prothorax beaucoup plus court, presque en demi-cercle et avec une tache discoïdale brune; sa partie diaphane est beaucoup moindre; les quatre premiers segments du ventre sont entièrement d'un noir brillant; le pygidium est arrondi ou indistinctement sinué.